



Cedrus libani subsp. atlantica



Hoogte	20 - 25 (40) m
Breedte	10-15m
Kroon	breed piramidaal, halfopen kroon, grillig groeiend
Schors en takken	donker zwartgrijze schors, geschubd, twijgen donzig behaard
Blad	naalden, lichtgroen tot zilverblauw, 2 - 2,5 cm, groenblijvend
Bloemen	onopvallend , geurende bloemen
Vruchten	tonvormige kegels, 5 - 7 cm lang, van groen naar bruin kleurend
Stekels/doorns	Geen
Giftigheid	gewoonlijk niet giftig voor mensen, (grote) huisdieren en vee
Grondsoort	alle, liefst goed doorlatend en niet te nat
Bodemvochtigheid	kan op droge grond
Verharding	verdraagt geen verharding
Winterhardheid	7a (-17,7 tot -15,0 °C)
Windbestendigheid	goed
Overige bestendigheden	bestand tegen wind
Toepassing	industriegebied
Vorm	hoogstam boom, hoogstam conifeer, solitaire conifeer
Oorsprong	Atlasgebergte (noordoosten van Algerije en noord Marokko)
Synoniemen	Cedrus atlantica

Deze geografische ondersoort van *Cedrus libani* is een snelgroeiende grote boom met op latere leeftijd horizontaal staande takken. Van nature groeiend op droge, kalkrijke berghellingen in het Atlasgebergte in noordwest Afrika. De stam is eerst nog grijs en glad maar wordt bij oude bomen ruwer. Later in kleine plaatjes loslatend waardoor de roodbruine bast vrij komt. De vertakking is vrij los en open en de twijgen zijn eerst nog grijsgroen tot grijsbruin maar worden in het tweede jaar grijs. De naalden staan in bundels van 20 - 40 bijeen en zijn 2 - 2,5 cm lang. In de herfst verschijnen de opstaande kegels. Jonge kegels zijn groen maar kleuren later paarsbruin tot bruin. Deze ceder verlangt veel zon en kan goed tegen luchtvervuiling.