



## Acer tataricum subsp. ginnala



|                               |                                                                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hoogte</b>                 | 5 - 7 (10) m                                                                                          |
| <b>Breedte</b>                | 5-7m                                                                                                  |
| <b>Kroon</b>                  | waaivormig, halfopen kroon                                                                            |
| <b>Schors en takken</b>       | stam grijs, iets gegroefd, jonge twijgen roodbruin                                                    |
| <b>Blad</b>                   | 3-lobbig, heldergroen, 4 - 8 cm                                                                       |
| <b>Herfstkleur</b>            | oranje, rood                                                                                          |
| <b>Bloemen</b>                | crèmewit, eindstandige trossen, mei/juni                                                              |
| <b>Vruchten</b>               | geveugeld, bijna parallel lopend, circa 2,5 cm lang                                                   |
| <b>Stekels/doorns</b>         | Geen                                                                                                  |
| <b>Giftigheid</b>             | gewoonlijk niet giftig voor mensen, (grote) huisdieren en vee                                         |
| <b>Grondsoort</b>             | alle                                                                                                  |
| <b>Bodemvochtigheid</b>       | kan op droge grond                                                                                    |
| <b>Verharding</b>             | verdraagt halfverharding                                                                              |
| <b>Winterhardheid</b>         | 3 (-40,0 tot -24,5 °C)                                                                                |
| <b>Windbestendigheid</b>      | goed                                                                                                  |
| <b>Overige bestendigheden</b> | bestand tegen vorst (WH 1 t/m 6), bestand tegen wind, bestand tegen strooizout                        |
| <b>Faunaboom</b>              | bestand tegen vorst (WH 1 t/m 6), bestand tegen wind, bestand tegen strooizout, drachtboom voor bijen |
| <b>Toepassing</b>             | boombakken, industriegebied                                                                           |
| <b>Vorm</b>                   | hoogstam boom, meerstammige boom                                                                      |
| <b>Oorsprong</b>              | Midden- en Noord-China, Japan, Mantsjoerije                                                           |
| <b>Synoniemen</b>             | Acer ginnala                                                                                          |

Acer tataricum subsp. ginnala groeit meestal uit tot een kleine, meerstammige boom. Door de spreidende takstand ontstaat uiteindelijk een mooie solitair. Ondanks de vrij trage groei kan deze esdoorn in volle ouderdom toch een hoogte en breedte van ruim 10 m bereiken. In de natuurlijke groeigebieden in Azië en Rusland komen zelfs nog grotere exemplaren voor. Jonge en slanke twijgen die voldoende zonlicht krijgen, kleuren roodbruin. Oudere takken hebben een grijze kleur. Bij het drielobbig blad is de middenlob smal en lang. Belangrijke sierwaarde is de herfstverkleuring van het glanzend donkergroene blad in vele tinten rood tot oranje. Op een zonnige standplaats vaak beter uitkomend. De fijne wortelgroei is plat oppervlakkig. Een zeer winterharde plant die goed bestand is tegen luchtvervuiling, droogte en strooizout.